



Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche

**Amadio**

**Modalità per la**  
**Raccolta dei campioni**

---

**ORARIO PRELIEVI:**

*dalle 07:30 alle 10:00 (dal lunedì al sabato)*

**RITIRO REFERTI:**

*dalle 10:00 alle 12:30 (dal lunedì al sabato)*

**APERTURA POMERIDIANA:**

*dalle 16:00 alle 18:00 (lunedì, mercoledì, venerdì)*

---

- **ESAMI URINE**
- **TEST DI GRAVIDANZA**
- **URINOCOLTURA**

Dopo l'igiene personale, raccogliere le prime urine del mattino in un contenitore sterile.

- **RACCOLTA URINE 24h**

Utilizzare un contenitore adatto a raccogliere le urine delle 24h e procedere nel seguente modo:

- il primo giorno scartare le prime urine del mattino
- raccogliere le altre urine fino alla stessa ora del mattino seguente

- **TAMPONI VAGINALI**

Le accortezze sono: non essere nel periodo mestruale, non effettuare l'igiene personale prima dell'esame, non aver utilizzato creme o ovuli vaginali per almeno una settimana.

- **SCOTCH TEST**

Al mattino, prima dell'igiene personale, applicare un pezzetto di scotch sullo sfintere anale, posizionandolo poi ben disteso sul vetrino fornito dal laboratorio. È consigliabile effettuare la prova per tre giorni consecutivi.

- **RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI**

Raccogliere le feci in un apposito contenitore.

- **ESAME CITOLOGICO DELLE URINE**

Eliminare le prime urine del mattino.

Eeguire l'igiene personale e bere due o tre bicchieri d'acqua entro un'ora.

Raccogliere le urine in un contenitore sterile.

È preferibile effettuare l'esame su tre campioni raccolti in tre giorni diversi.

- **ESAME LIQUIDO SEMINALE**

- 1) Osservare 4 giorni di astinenza dai rapporti sessuali

- 2) Raccogliere lo sperma in un contenitore sterile

- 3) Consegnarlo al laboratorio entro 30 minuti dalla raccolta

- **ACIDO LATTICO**

Rimanere a riposo per 30 minuti in sala d'attesa prima del prelievo.

- **ESAMI DEL SANGUE GENERICI**

Restare a digiuno dalla mezzanotte.

- **CURVA GLICEMICA 75 gr**

Il paziente effettua un primo prelievo a digiuno.

Subito dopo, beve una soluzione glucosata fornita dal laboratorio.

Una volta assunta la soluzione, si ripete il prelievo dopo il tempo specificato nella prescrizione medica.

- **BREATH TEST PER HELICOBACTER PYLORI**

Restare a digiuno

Non assumere gastroprotettori per almeno una settimana

- **INTOLLERANZE ALIMENTARI**
- **QUANTIFERON**
- **INTOLLERANZA GENETICA AL LATTOSIO**
- **INDICE ROMA**
- **ORMONE ANTIMÜLLERIANO**
- **DOSAGGIO FARMACI**

Questi esami consistono in un normale prelievo di sangue effettuato a digiuno, senza alcuna preparazione particolare.

- **ESAME COLTURALE LIQUIDO SEMINALE**

Dopo l'igiene personale raccogliere lo sperma in un contenitore sterile e consegnarlo al laboratorio.

*Il Laboratorio Amadio è a vostra disposizione per fornire ogni informazione in merito agli esami da eseguire, alla loro preparazione (se necessaria) e ai tempi di esecuzione*